

WELL CHILD EXAM - INFANCY: 6 MONTHS

(Meets EPSDT Guidelines)

DATE	

유아기 (6개월)					
		를 데리고 온 사람: 생년월일			
	알레르기 문제	현재 복용하고 있는 약품	•		
	지난 방문 이후의 질병/사고/문제/염력사항 등	오늘 질문한 사항:			
- 20 마 한 다					
<u>n</u>	예 아니오 이른 음식을 얼마간 먹습니다.	예 아니오 물건을 집을 수 있습니다.			
0	│				
	집아주거나/등을 받쳐 주면 앉습니다. 나를 알아 봅니다.				
	저는 자주 슬픈 기분이 들지는 않습니다.				
WEIGHT K	G./OZ. PERCENTILE HEIGHT CM/IN. PERCENTILE HEAD CIR. PERCENTILE	Diet			
R	eview of systems Review of family history	Elimination			
		Sleep	-		
		Review Immunization Record Lead exposure			
Screer		Fluoride Supplements Fluoride Varnish Hct/Hgb)		
Hearin Vision	9	Health Education: (Check all discussed/handouts given)			
	ppment: Circle area of concern	Family Planning Safety Infant Temperament			
Adapti	ve/Cognitive Language/Communication	Development Crib Safety Shaken Baby Syndrome			
Gross Fine M		No Bottle in Bed Feeding Fever			
Behav		Teething/Dental Bedtime ritual			
Mental	Health	Language Stimulation Stranger Anxiety			
Physic		Appropriate Car Seat Child care Passive Smoke	Э		
Skin	al appearance Chest Lungs	Other:	_		
	Fontanelle Cardiovascular/Pulses	Assessment/Plan:			
	Cover/Uncover) Abdomen				
Ears Nose	Genitalia Spine				
Oropha		<u> </u>	—		
Neck	Neurologic L	J			
Nodes			_		
Describe abnormal findings and comments:					
		IMMUNIZATIONS GIVEN			
		REFERRALS			
NEXT VISIT: 9 MONTHS OF AGE		HEALTH PROVIDER NAME			
HEALTH PROVIDER SIGNATURE		HEALTH PROVIDER ADDRESS			
DSHS 13-68	33C KO (REV. 08/2004)	CEE DICTATIO			

5.075.5.17.6.1

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

SEE DICTATION

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Infancy (6 months)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Look for white spots or decay on teeth. Check for history of decay in family. Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999--00.(21)5.

Hearing Screen

Use clinical judgment.

Lead Screen

Screen infants for these risk factors:

- Live in or frequently visit day care center, preschool, baby sitter's home or other structure built before 1950 that is dilapidated or being renovated.
- Come in contact with other children with known lead toxicity (i.e., blood lead 15ug/dl).
- Live near a lead processing plant or with parents or household members who work in a lead-related occupation (e.g., battery recycling plant).

Developmental Milestones

Always ask about and follow-up on parent concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, the ELMS2 (a language screen), or the MacArthur Communication Development Inventory.

Yes	No		Yes	No		
		No head lag when pulled to sit.			Turns toward voice.	
		Bears some weight on legs when held.			Transfer object from	hand to hand.
		Rolls over.			Cuddles.	
		Imitates speech sounds.	Α	voids	eye contact.	

Instructions for developmental milestones: At least 90% of infants should achieve the underlined milestones by this age. If you have checked "no" on any two items, or even one of the underlined items, or the boxed item, refer the infant for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies (1-800-322-2588) with questions or concerns on childhood development.



건강진단 - 유악기 (6개월)

WELL CHILD EXAM - INFANCY: 6 MONTHS

(EPSDT 직침 준수)

(ELODI TE ET)					
		유 아 기	l (6 개월)		
	아동의 이름	아기를	데리고 온 사람:	생년월일	
	알레르기 문제		현재 복용하고 있는 약품		
/	지난 방문 이후의 질병/사고/문제/염력사항 등		오늘 질문한 사항:		
마 어					
이 미리 작성	예 아니오 어른 음식을 얼마간 먹습니다.		예 아니오 물건을 집을 수 있습니다.		
0	"다다" 혹은 "바바"라고 소리를 잡아주거나/등을 받쳐 주면 앉		아기가 행복해 보입니다.		
	저는 자주 슬픈 기분이 들지는				
체중 KG./OZ		머리둘레 백분율	식사		
시체건사 가족병략건트			 배설(대/소변)		
신체검사			수면		
 검사항	목: 정상 비정상		예방접종 기록 검토 물소보충 물소보충 불	□ 납성분 노출 Hct/Hgb 소처리 □ (헤마토크리토/	
청력검사		보건교육: (의논을 하였거나/제공된 모든 인쇄물에 체크)			
발달 ^	└── └── ─── ㅏ항: 염력하는 부문에 동그라미로 표하십시s	2.	가족계획 안전 발육(발달)상태 ☆아용 침디 안전성	유 아기 짜증 유 아요동증후군	
적응력/인식력 언어능력/의사소통 대 운동근육(신경) 사회적/정서적 사항 소 운동근육(신경)		작자리에서 우유병 식사 사용하지 않기 식사			
고 단증 행동사			젖니 나기/치과 잠자리		
정신건 신체:	강 정상 비정상	 정상 비정상	연어(말) 고무시키기 및 및 목정 카-시트 목약	낯가림의 심화 ↑소	
외모	8		기타:		
	수리 후천문 심장혈관/역	백박	 평가/계획:		
눈(가림 귀	/가리지 않음)				
코 구강인	부 첫추 수족(손발)				
목 결절	전경				
이상 건강에 대한 설명이나 의견:					
		예방접종			
			의뢰		
다음 방문: 9개월		진찰자 성명			
진찰자 서	령		진찰자(진료원) 주소		

유아기: 6**개**월

DSHS 13-683C KO (REV. 08/2004)

구술 참조

날짜

6개월 아동의 건강

성장 과도기

6개월에서 9개월 사이의 아이 발욱 범위들

"바-바-바"나 "다다"라고 옹알이를 합니다.

조그마한 물건 등을 주먹으로 쥔 다음 손가락으로 즵니다

물건을 입으로 가져갑니다. 부드럽고 잘게 썰인 음식을 자기 스스로 먹을 수 있습니다.

잘 앉습니다.

무얼 잡고 설 수 있습니다.

배로 바닥을 이리 저리 움직이거나 기기 시작합니다.

낮선 사람에게 낮가림을 할 수 있습니다.

아이가 새로운 제주를 배우는 데 도움이 되도록 아이와 대화하고 놀아줍니다.

도움이나 상세한 정보를 원할 때

장난감과 유악용 제품 안전 정보 : Consumer Product Safety Commission, 1-800-638-2772 (음성) 혹은 1-800-638-8270 (TTY 작막)

유아 및 아동을 위한 CPR 과 응급치료 배우기: 지역의 소방소나 미 적십자사 혹은 심장협회 지부 혹은 보건부에 전화해서 강의에 대해 문의하십시오.

악동의 건강과 발육상태, 예방접종: Healthy Mothers, Healthy Babies 정보 및 의뢰 기관 전화 번호, 1-800-322-2588 (음성)혹은 1-800-833-6388 (TTY 자막)

양욱기술과 지원정보: 가족 헬프 전화번호, 1-800-932-HOPE (4673) Family Resources Northwest, 1-888-746-9568 지역 커뮤니티 칼리지 강좌

건강정보

대부분의 백신을 몇 차례씩 접종해야 완전히 면역될 수 있습니다. 아직 마치지 않은 백신이 있으면 예약을 해 접종시키도록 하십시오.

색깔이 다양한 그림책을 보여주고 그림에 관해서 말해 줍니다. 간단한 동요나 자장가를 되풀이 해서 들려 주십시오

이유식 시작 시기:

- 붙잡아 주면 혹은 주지 않아도 앉을 수 있습니다.
- 부모가 먹는 음식을 먹으려고 합니다.
- 혀로 음식을 삼킬 수 있습니다.

배 불리 먹었다는 것을 알 수 있습니다. 아기가 음식을 뱉거나 혹은 입을 다물고 고개를 이리 저리 돌리면 그만 먹이면 됩니다. 식사량은 아기에게 맡겨 두십시오.

컵으로 마시는 법을 가르켜 주십시오. 물, 모유, 우유 등을 아기용 컵에 넣어 줍니다. 잠자리에서는 우유병을 빨리지 않도록 하십시오.

양욱 정보

장시간 엎드려서 놀도록 하십시오. 장난감을 조금 떨어진 곳에 두어 아기가 그것을 갖기 위해 기어 가도록 하십시오.

"손바닥 치기(Pat-a-cake)" 놀이나 "까꿍" 놀이를 합니다.

안전 정보

아기가 기기 시작하기 전에 아기를 위해 집을 안전하게 꾸미십시오. 몇 년동안은 안전을 유지할 필요가 있습니다

- 조그마한 물건이나 깨어지기 쉬운 물건 들을 처웁니다
- 전기선을 벽에 테이프로 고정시키고 전기코드 콘세트에는 커버를 끼워 놓습니다.
- 층계 위쪽과 아래쪽 입구에 안전문을 달아 놓습니다.
- 독극성 물질과 약은 케비넷에 넣어 잠긨 보관합니다.

보행기는 다른 유아용 제품보다 사고 발생율이 높습니다. 보행기 대신에 바퀴가 없는 의자를 사용하거나 바닥에 아기를 엎드려 놓으십시오.